

# Coronavirus nuevo: Actualización Maryland EMS

## Programa de enfermedades infecciosas de EMS

Debido al reciente brote del nuevo coronavirus en China continental, MIEMSS urge a los profesionales médicos de EMS que brindan atención antes de llegar al hospital para que tomen las siguientes medidas:

- 1. Preguntarle a los pacientes sobre viajes recientes, particularmente a los pacientes que tengan fiebre y enfermedad respiratoria aguda.**
- 2. Use el EPP adecuado cuando los pacientes cumplan con los criterios de "persona bajo investigación" (PUI).**
- 3. Si un paciente cumple los criterios de PUI, los profesionales médicos de EMS deben transportarlo al hospital adecuado, asegurarse de comunicarse con el hospital a través de EMRC antes de iniciar el transporte, y usar el término "PUI" cuando soliciten un canal médico para consulta.**

### Criterios de "paciente bajo investigación" (PUI)

Características clínicas		Riesgo epidemiológico
Fiebre <b>o</b> señales/síntomas de infecciones respiratorias en las vías bajas (por ej., tos o dificultad para respirar)	<b>Y</b>	Cualquier persona, incluyendo los trabajadores de atención médica, que haya tenido contacto directo con un paciente con el nuevo coronavirus 2019 confirmado por laboratorio en un plazo de <b>14 días</b> después de iniciarse los síntomas
Fiebre <b>y</b> señales/síntomas de infecciones respiratorias en las vías bajas (por ej., tos o dificultad para respirar)	<b>Y</b>	Persona que haya viajado desde <b>China continental</b> en un plazo de <b>14 días</b> después de iniciarse los síntomas

**Recomendaciones de PPE:** Si el paciente cumple con los criterios de PUI, los profesionales médicos deben usar guantes, batas, protección de ojos y respiradores con buen ajuste de nivel N-95 o superior. Al paciente se le debe colocar una mascarilla quirúrgica y NO un respirador N-95.

**Desinfección de la ambulancia:** Toda superficie visiblemente sucia se debe desinfectar primero con un desinfectante de uso hospitalario registrado con EPA y siguiendo las instrucciones en la etiqueta. Se deben desinfectar todas las superficies que pudieran estar contaminadas, como la camilla, con un desinfectante de uso hospitalario registrado con EPA y siguiendo las instrucciones en la etiqueta. El equipo médico (estetoscopio, esfigmomanómetro, etc.) que tenga contacto con el paciente debe ser desechable o se debe limpiar y desinfectar con los desinfectantes adecuados antes de usarse con otro paciente.

Referencias y recursos: <http://www.miemss.org/home/infectious-diseases>

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html#risk-assessment>

<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>



Aunque el nuevo coronavirus de 2019 es una enfermedad en evolución y preocupante, la transmisión de gripe estacional y de otras enfermedades infecciosas siguen siendo motivo de preocupación. Los profesionales médicos de EMS le deben colocar una mascarilla quirúrgica a todos los pacientes que presente señales y síntomas de infecciones respiratorias de vías bajas. Además, deben usar equipo de protección personal adecuado (PPE en inglés) y le deben preguntar al paciente sobre su historial de viajes.

**La mejor manera de evitar la transmisión de enfermedades infecciosas sigue siendo el uso de precauciones estándar, mantenerse al día con las vacunas recomendadas y lavarse las manos según las rigurosas prácticas de higiene.**



**GUÍA PROVISIONAL, ÁREA DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y OTROS FACTORES ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS**



# CONSIDER Novel Coronavirus

GUÍA PROVISIONAL, ÁREA DE RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y OTROS FACTORES QUE ESTÁN SUJETOS A CAMBIO

Características clínicas		Riesgo epidemiológico
Fiebre o señales/síntomas de infecciones respiratorias de vías bajas (por ej., tos o dificultad para respirar)	Y	Cualquier persona, incluyendo los trabajadores de atención médica, que haya tenido contacto directo con un paciente con el nuevo coronavirus 2019 confirmado por laboratorio en un plazo de <b>14 días</b> después de iniciarse los síntomas
Fiebre y señales/síntomas de infecciones respiratorias de vías bajas (por ej., tos o dificultad para respirar)	Y	Persona que haya viajado desde <b>China continental</b> en un plazo de <b>14 días</b> después de iniciarse los síntomas

Si se cumplen los criterios de "paciente bajo investigación" (PUI, por sus siglas en inglés):

Aíslelo y colóquele una mascarilla (quirúrgica) simple al paciente

Y

Use el equipo de protección personal apropiado (PPE, por sus siglas en inglés), como guantes, batas, protección de ojos y respiradores con buen ajuste de nivel N-95 o superior

Y

Notifique al hospital a través de EMRC, antes de iniciar el transporte del paciente, y utilice el término "PUI" cuando se solicite un canal médico para consulta

<http://www.miemss.org/home/infectious-diseases>